

История и описание сорта

Оригинатор J.W.A. Lefeber, 1943, Голландия. Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, без аромата. Доли околоцветника яйцевидные, белые, у основания с желтым ореолом. Коронка блюдцевидная, высотой 1,7 см, 3,5 см в диаметре, ярко-желтая с оранжевой каймой по гофрированному краю. Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 - 10.05 в течение 10 - 14 дней. Продуктивность цветения 3,8. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы крупнокорончатых. Цветки диаметром до 9,0 см; лепестки кремовато-белые, длина до 3,8 см; коронка темно-желтая, блюдцевидной формы, высота 1,5 см, диаметр 3,6 см; край коронки с оранжевой бахромчатой каймой, 0,4 см. Высота цветоноса до 36 см. Средняя дата начала цветения 9.V, наиболее ранняя - 28.VI. Средняя продолжительность цветения 14 дней. Коэффициент размножения 5,5. Групповые посадки, срезка (ГБС, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)