

История и описание сорта

Оригинатор R. van der Schoot, 1930, Голландия. Группа тацеттов (8). Цветки до 6,5 см в диаметре, приятно ароматные, 5 – 6 на цветоносе. Доли околоцветника белые с желтым ореолом у основания, овальные, несколько отогнуты к цветоносу. Коронка чашевидная, 0,5 см высоты, 1,8 см в диаметре, ярко-оранжевая, слегка гофрированная. Край коронки разделен на неглубокие лопасти. Высота растений до 37,0 см. Цветут с 5 – 18.05 в течение 10 – 16 дней. Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,9.

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. – Минск, 2009. – 103с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы тацетовидных. Цветки с сильным приятным ароматом, диаметр 4,5 – 5 см. Кисти 2-3-цветковые; лепестки чисто белые, длина до 2,2 см; коронка оранжевая, у основания темно-желтая, чашевидной формы, высота до 0,4 см, диаметр до 1 см. Высота цветоноса до 31 см. Средняя дата начала цветения 20.V, наиболее ранняя – 10.V. Средняя продолжительность цветения 11 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 1,1. Групповые посадки, срезка, выгонка (ГБС, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)