

История и описание сорта

Оригинатор Engleheart, 1913, Англия. Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, с сильным ароматом. Доли околоцветника белые, ланцетные, не перекрываются, часто выгибаются назад по долевым линиям. Коронка чашевидная, 1,2 см высоты, 2,3 см в диаметре, лимонно-желтая, слегка гофрирована и рассечена на 6 неглубоких лопастей, по краю которых проходит прерывистая оранжево-красная полоска. Высота растений до 48,0 см. Цветут с 1 - 2.05 в течение 8 - 14 дней. Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 5,6.

Сорт пригоден для групповых посадок. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы корончатых. Цветки со слабым ароматом, диаметр до 6,5 см; лепестки зеленовато-белые, длина до 3 см; коронка также зеленовато-белая, высота 1,2 см, диаметр 1,6 см. Высота цветоноса до 48 см. Средняя дата начала цветения 7-8.V. Средняя продолжительность цветения 10 дней. Не плодоносит. Выгонка, срезка (Киев, 1957, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)