

## История и описание сорта

Оригинатор R. van der Schoot and Son, 1904, Голландия. Группа тацеттов (8). Цветки до 5,5 см в диаметре, ароматные, 2-3 на цветоносе. Доли околоцветника ланцетные, белые с зеленоватым оттенком и желтым ореолом у основания. Коронка блюдцевидная 0,3 см высоты и 1,3 см в диаметре, желтая. По самому краю коронки ниточкой проходит красная полоска, которая подгорает на солнце. Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3-14.05 в течение 11-17 дней. Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.

Сорт пригоден для групповых посадок, срезки, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

\*\*\*

Из группы тацетовидных. Цветки с очень сильным ароматом, диаметр до 5,7 см; кисти 2-4-цветковые, чаще 3-цветковые; лепестки кремовато-белые, длина до 2,2 см; коронка ярко-желтая, чашевидной формы, высота до 1,4 см, диаметр до 2,2 см, край гофрированный, кайма оранжевая. Высота цветоноса до 41 см. Средняя дата начала цветения 12.V, наиболее ранняя - 26.IV. Средняя продолжительность цветения 14 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 2,3. Групповые посадки, срезка, выгонка (Адлер, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)