

## История и описание сорта

Оригинатор Persival D. Williams, 1927, Англия. Группа крупнокорончатых (2a). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли околоцветника яйцевидные с заостренными кончиками, желтые. Коронка воронковидная, высотой 3,0 см, диаметром 4,0 см, темно-желтая. Край коронки прямой, складчато-лопастной. Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 - 10.05 в течение 9 - 16 дней. Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

\*\*\*

Из группы крупнокорончатых. Цветки со слабым ароматом, диаметр до 10 см; лепестки желтые, отогнутые назад, длина до 4 см; коронка темно-желтая, высота до 3 см, диаметр 3,5 см, чашевидной формы, с бахромчатыми краями. Высота цветоноса до 35 см. Средняя дата начала цветения 13.V, наиболее ранняя - 23.IV. Средняя продолжительность цветения 12 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 2. Групповые посадки, срезка, выгонка (ГБС, 1955, детка). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)