

История и описание сорта

Оригинатор Rev. Geo. H. Engleheart, 1923, Англия. Группа трубчатых (1с). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли околоцветника эллипсоидные, при раскрытии цветка кремовые, затем отбеливаются. Трубка узкая, до 4,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, с отогнутым гофрированным краем, желтоватая в начале цветения, постепенно отбеливается. Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 – 5.05 в течение 10 – 15 дней. Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4.

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. – Минск, 2009. – 103с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы трубчатых. Цветки со слабым неприятным ароматом, диаметр до 10 см; лепестки белые с едва заметным кремовым оттенком, длина 4 см, отогнутые назад; трубка кремовато-белая, высота 4 см, диаметр 3,8 см, с волнистым краем. Высота цветоноса до 33 см. Средняя дата начала цветения 8.V, наиболее ранняя – 23.IV. Средняя продолжительность цветения 14 дней. Коэффициент размножения 3,7. Групповые посадки, срезка, выгонка (ГБС, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)