

История и описание сорта

Оригинатор R. van der Schoot and Son, 1923, Голландия. Группа махровых (4). Цветки с приятным, сильным ароматом, до 5,0 см в диаметре, 3 - 4 на цветоносе. Доли околоцветника белые, у основания с желтым ореолом, округлые. Коронка белая, блюдцевидная, 0,4 см высоты и 1,5 см в диаметре. Внутри коронки расаположены желтые выросты, высотой до 1,0 см. Край коронки подгорает на солнце. Высота растений до 43,0 см. Цветут с 5 - 19.05 в течение 13 - 17 дней. Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы махровых. Цветки с очень сильным приятным ароматом, диаметр до 5 см; кисти 3-5-цветковые; лепестки кремовато-белые, длина до 2,2 см, выросты между ними кремовые. Высота цветоноса до 41 см. Средняя дата начала цветения 16.V, наиболее ранняя - 4.V. Средняя продолжительность цветения 14 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 1. Групповые посадки, срезка, выгонка (ГБС, 1958, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)