

## История и описание сорта

Оригинатор J. de Groot and Son, 1914, Голландия. Группа трубчатых (1a). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли околоцветника соломенно-желтые, овальные, слегка закручиваются по спирали, складываются внутрь сопочком, и приподнимаются к трубке. Трубка ширококолокольчатая, 4,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, золотисто-желтая. Край трубки отогнут, рассечен на некрупные, слегка гофрированные лопасти. Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 – 5.05 в течение 11 – 18 дней. Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.

Сорт пригоден для групповых посадок, срезки, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. – Минск, 2009. – 103с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

\*\*\*

Из группы трубчатых. Цветок ароматный, диаметр до 9 см; лепестки кремовые, вытянутой формы, заостренные к верхушке, длина до 4 см, ширина 1,7 см; трубка желтая, края волнистые, высота до 4 см, диаметр до 4,5 см. Высота цветоноса 35 – 38 см. Средняя дата начала цветения 3.V, наиболее ранняя – 22.IV. Средняя продолжительность цветения 12 дней. Не плодоносит. Срезка, выгонка (Адлер, 1961, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)