

История и описание сорта

Группа махровых (4). Цветок до 9,0 см в диаметре, почти без аромата. Доли околоцветника желтые с зеленоватым оттенком, ланцетные. Коронка трубковидная, до 4,3 см высоты и 3,5 см в диаметре, желтая. Край коронки рассечен на лопасти. Внутри коронки находятся до 40 желтых выростов, почти достигающих края коронки. Часто коронка разрывается, и цветок становится полностью махровым. Высота растений до 28,0 см. Цветет с 1 - 5.05 в течение 7 - 14 дней. Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.

Сорт страдает от многих болезней, пригоден для групповых посадок. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы махровых. Цветки диаметром до 7 см; лепестки (35-40) желтые с зеленоватым оттенком, отдельные зеленоватые с желтым оттенком, длина 3,0 - 3,2 см. Высота цветоноса 18 - 20 см. Средняя дата начала цветения 9.V, наиболее ранняя - 23.IV. Средняя продолжительность цветения 13 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 4,5. Групповые посадки, срезка, выгонка (Адлер, 1961, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)