

История и описание сорта

Оригинатор С.Р. Alkemade; van Zonneveld Hros and Phillippo, 1930, Голландия. Группа тацетов (8). Цветки до 4,0 см в диаметре, приятно ароматные, 5 - 7 в кисти. Доли околоцветника белые, округлые, часто согнуты сопочком и слегка приподняты к центру цветка. Коронка чашевидная, 0,5 см высоты, 1,1 см в диаметре, ярко-желтая. Высота растений до 41,0 см. Цветут со 2 - 11.05 в течение 12 - 18 дней. Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.

Сорт пригоден для групповых посадок, срезки, выгонки. (Завадская Л.В. и другие. Коллекционный фонд нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. - Минск, 2009. - 103с. - Деп. в ГУ «БелИСА» 23.11.2009 г., № Д200938.)

Из группы тацетовидных. Кисти 4-6-цветковые. Цветки с приятным ароматом, диаметр до 4,5 см; лепестки беловато-кремовые, длина до 2 см; коронка оранжево-желтая, высота до 0,6 см, диаметр до 1,5 см. Высота цветоноса до 42 см. Средняя дата начала цветения 11.V, наиболее ранняя - 29.IV. Средняя продолжительность цветения 12 дней. Не плодоносит. Коэффициент размножения 2. Срезка, выгонка (ГБС, 1957, луковицы). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)