

Дичающий вид. Могилевская обл., Кировский р-н, окр. д. Думановщина, 1 км к С, у дороги Думановщина-Морховичи. В субори чернично-мшистой по небольшой свалке бытовых отходов, несколько экземпляров. 26.06.96, № 288. Гомельская обл., Октябрьский р-н, окр. д. Грабье, 0,7 км к В, у дороги Грабье-Озаричи, кв. 8 Ломовичского л-ва. В кювете шоссе на опушке сосняка, единично. 16.08.2000, № 1441. Гербарные материалы хранятся в Гербарии ИЭВ НАН Беларуси (MSK). (Дубовик Д.В. Особенности натурализации некоторых интродуцированных видов травянистых растений во флоре Беларуси / Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира. - Минск: УИЦ, 2002. - С.94-95.)

Свойства, проявленные в культуре

Растения бульбоносные, их высота достигает 150 см. Стебель прямой, цилиндрический, бурый с густым беловойлочным опушением. Листья очередные, ланцетные с оттянутыми концами, длиной 9-15 см, шириной 1,2-2,5 см, обычно опушенные по краям. Соцветие кистевидное из 5-9 чалмовидных цветков, ориентированных вниз и чуть в сторону. Околоцветник оранжево-красный с крупным темным крапом. Нектарники густоопушенные, параллельно им располагаются многочисленные ребра и сосочки. Тычинки расходятся в стороны от пестика. Тычиночные нити и столбик оранжевые. Пыльники и пыльца коричневые. Рыльце булавовидное. Цветет с конца июля, продолжительность цветения 15-19 дней. (Завадская Л.В. Лилии коллекционного фонда Центрального ботанического сада НАН Беларуси [Электронный ресурс] / Л.В. Завадская; ГНУ ЦБС НАН Беларуси. - Минск, 2010. - 103с. - Библиогр.: с. 102 (9 назв.). - Рус. - Деп. в ГУ «БелИСА» 27.10.2010 г., № Д201030)