

Ствол твердый, 6-12 м высотой, густо покрытый темными волокнами и длинными колючками. Листья перистые, 6-7 м длиной и 4.5-3 м шириной, почти прямостоячие; доли в числе 80-100 пар, 1-1.25 м длиной, с 1-2 ушками у основания, темно-зеленые, беловатые снизу.

Черешок 60-90 см, гладкий, крепкий, в грубых волокнах и густо покрытый шипами у основания. Соцветия 1.5-3 м длиной, пазушные, разветвленные; на одних початках мужские, на других женские цветки. Плод - костянка, 5 см длиной. Сок околоплодника едкий (вызывает воспаление кожи).

Цветет на 10-12-й год; цветение продолжается до 2 лет, а созревание плодов - до 3-4 лет, поэтому на дереве можно видеть одновременно цветки и созревшие плоды. После созревания всех плодов дерево гибнет.

Встречается во влажных низинах в Юго-Восточной Азии, от полуострова Малакка до Филиппин, на п-ове Индокитай.

Из сока мужских соцветий готовят вино Тодди; в соке до 20% сахара - ягери (после кристаллизации). Культивируется в теплых оранжереях. (Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. - Ленинград: Наука (ЛО), 1983. - 621с.)