

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник до 2 (редко до 5) м высотой, сильноветвистый, с красно-коричневыми побегами. Почки овальные, заметные, с перекрывающимися чешуями. Листья простые, от эллиптических, до удлинненно-яйцевидных, к основанию клиновидно-суженные, заостренные или острые, на верхушке с хрящеватым острием, цельнокрайние или выше середины зубчатые, 3-6 см длиной, сверху светло-зеленые, снизу беловато-желто-зеленые; черешки 8-15 мм длиной. Цветки пятерного типа, чисто белые, до 4 см в диаметре, собранные по 6 - 10 в конечные кистевидные соцветия; лепестки плоские, круглые, с очень коротким ноготком; тычинок 15, пестиков 5; чашелистики при плодах опадающие. Плоды из пяти сросшихся листовок, почти шаровидные, 8-10 мм длиной.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. Размножают посевом семян, отводками и летними черенками.

В Ботаническом саду при весеннем посеве без предварительной стратификации всходы отмечены в среднем через 50 дней. Побеги почти ежегодно подмерзают, но растение восстанавливается и цветет. В суровую зиму обмерзла вся надземная часть до корневой шейки; переносит морозы - 39°. Цветет в мае - начале июня, но не плодоносит; если в отдельные годы плоды завязываются, то они не вызревают.

Очень декоративный кустарник с крупными белыми цветами, появляющимися сравнительно рано. Заслуживает более широкого испытания в условиях БССР для всех районов, кроме северного. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск, Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. - 351с.)