

В Беларуси: заносный вид. (Третьяков, 1998)

Инвазионные свойства, проявленные в России

Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада РАН и Ботанического сада МГУ

Травянистый многолетник. Европейско-кавказско-малоазиатский вид. Известен одичавшим близ Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде и близ Серпухова. В Москве впервые обнаружен А.К. Скворцовым (1982 г.), в Кусково, где этот вид сейчас доминирует вдоль дорожек в северо-восточной части лесопарка, вытеснив куперь лесной и другие обычные виды. В 1989-1992 гг. обнаружен на нескольких железных дорогах Москвы, где местами сформировал обширные и устойчивые колонии. Заросли этого вида отмечены в 2010 г. в Тушино, в 2011 г. - в Лосином острове, а в 2012 г. в поселке Северный и у площадки Хлебниково Савеловской железной дороги за пределами МКАД (Майоров и др., 2012).

2 категория статуса (Инвазионные виды; +++). В ГБС РАН привезен семенами из Кабардино-Балкарии в 1949 г., дает самосев, встречается совершенно одичавшим близ экспозиций природной флоры. На территории Ботанического сада МГУ образует несколько устойчивых колоний в дендрарии. Цветение в июне-июле. (Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Бочкин В.Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160с.)