

В Беларуси: один из наиболее опасных широко распространенных заносных видов. Существенно снижает качество лугов и пастбищ. (Дубовик Д.В., Скуратович А.Н., Третьяков Д.И. Инвазионные виды во флоре Беларуси // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов: материалы II международной научно-практической конференции. – Минск: Минсктиппроект, 2012. – С.443-446.)

Выращивается, иногда дичает. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. – Минск: Дизайн ПРО, 1999. – 472 с.)

На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить существенный вред, в том числе биоразнообразию. (Дубовик Д.В. и др. Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. – Минск: Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. – 192с.)

Свойства, проявленные в культуре

Лиственно-декоративное и красивоцветущее растение. Высота 60–90 см. Листья розеточные пальчатосложные до 20 см в поперечнике. Цветки в густой кисти длиной 20–40 см. Цветет с середины июня в течение 25–30 дней. Плодоносит. Образует массовый самосев. Холодостоек. Повреждается мучнистой росой. Вторая генерация листьев появляется в конце июля. Перспективен для групп, миксбордеров. (Сидорович Е.А., Лунина Н.М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: Наука и техника. – 1992. – 136с.)

Многолетник. Год интродукции авторами: 1969. Размножение семенное Посев под зиму. Зацветает в 1-й год. Цветет VI – VII, плодоносит VII – VIII. Высота 80 – 130 см. Сидерат, лекарственное, медоносное, кормовое, декоративное. (Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986.)

Растение высотой до 150 см, с почти голыми стеблями. Листья снизу опушенные. Цветки синие (у садовых форм белые, розовые, красные, желтые, двухцветные), собраны в многоцветковую кисть, длиной до 75 см. Цветет в июне, вторично – в августе – сентябре, если обрезать цветонос после первого цветения. Имеются многочисленные садовые формы и сорта: Абендглот с темно-красными цветками; Альбус с белыми; Априко с оранжевыми; Карминеус с карминовыми; Принцесса Юлиана – с бело-розовыми; Розеус – с розовыми; Рубинкениг – с рубиново-фиолетовыми; Суитхарт – с кремовыми; Перпл Найт – с пурпурово-розовыми цветками и др. (Справочник цветовода: цветочно-декоративные растения открытого грунта / И.Е. Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. – Минск: Урожай, 1984. – 207с.)

Растения высотой до 100 см. Листья длинночерешковые, снизу волосистые. Цветки синие, у садовых форм от белых до красных, в кистях до 50 см длиной. Цветет с 5-12.VI в течение 25–30 дней. Для групповых посадок (Свердловск, семена, 1967). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312с.)