

Синонимы: *Flueggea suffruticosa* (Pall.) Baillon.

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник до 2 м высотой. Ветви прутьевидные, в молодости покрытые зеленоватой корой, которая впоследствии становится сероватой. Листья очередные, короткочерешковые, иногда сближенные и кажутся супротивными, ярко- или желто-зеленого цвета. Листовая пластинка кожистая, 2 - 1 см длиной и 1 - 2 см шириной, эллиптическая или реже обратнойцевидная, к основанию клиновидно суженная, а на верхушке закругленная или с небольшим шипиком, по краям неправильно мелкозубчатая, слабозавороченная внутрь. Цветки двудомные, пазушные, зеленовато-желтые или зеленые, тычиночные в густых клубочках, а пестичные одиночные или по 2 - 3; доли 5 - раздельной чашечки надрезаннозубчатые. Плод - коробочка, около 5 мм в поперечнике, сплюснутая, с 2 - 3 семенными дольками размером 3,2x5 мм, с 4 - 8 семенами. Семена тупотрехгранные, гладкие. В 1 г до 400 тыс. семян. Вес 1000 семян 2,5 г.

Посев осенью после сбора семян или весной стратифицированными в течение 3 - 4 месяцев.

Растет на сухих каменистых и скалистых горных склонах, на песчано-галечных отложениях, речных песчаных террасах, лесных опушках, образуя заросли.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в госпитомнике "Щемыслица". В УССР - в ряде ботанических садов; в Киеве подмерзают концы побегов.

В Ботаническом саду АН БССР растения выращены из семян, полученных из Ашхабада, Москвы, Лунда, Вены, Вагиненгена, Киева. Ежегодно отмечается подмерзание побегов в различной степени, но весной хорошо отрастают. Облиствение в мае, опадение листьев, в сентябре - октябре, цветет в июне, плоды созревают в сентябре - октябре. Декоративна. Новое алкалоидоносное и перспективное в лекарственном отношении растение. Заслуживает более широкого разведения на территории БССР, за исключением Северного района. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск, Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. - 351с.)