

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник 1 - 2 м высотой, Молодые побеги слегка волосистые, позже голые. Листья широкояйцевидные, на конце удлинненно-заостренные, в основании сердцевидные или округлые, по краю зубчатые, сверху зеленые, голые, снизу сизоватые, мелковолосистые, 6 - 15 см длиной. Соцветия щитковидные, до 15 см в диаметре. Бесплодные цветки кремово-белые, 1 - 1,5 см в диаметре; завязь нижняя. Плод - 4 - 5-гнездная коробочка, 3X2 - 2,5 мм. Семена многочисленные, мелкие, коричневые, ланцетные. Вес 1000 семян около 0,05 г.

Естественное распространение. Северная Америка от Нью-Йорка до Луизианы и до Айовы.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В СССР - в культуре в Ленинграде (подмерзает, не цветет); в Прибалтике зимостойка; на Лесостепной опытной станции зимует, цветет, но плодоносит слабо; на Украине подмерзает, но цветет; в Крыму, на Кавказе. В Ботаническом саду имеется несколько растений неизвестного происхождения, в 18 - 20 лет более 1 м высотой. В суровые зимы подмерзают, но цветут и плодоносят. Облиствение в мае, сбрасывание листьев в октябре; цветет в июле; плоды созревают в сентябре.

Декоративный кустарник, пригодный для озеленительных целей на всей территории БССР. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной Америки. - 297с.)