

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Третьяков, 1998)

Свойства, проявленные в культуре

Раскидистый кустарник до 3 м высотой, Молодые побеги красноватые. Кора плотная, серая, слегка растрескивающаяся, иногда слабоотслаивающаяся. Листья яйцевидные до яйцевиднолан-цетных, 4-10 см длиной, и 3-5 см шириной (у нецветущих побегов гораздо больших размеров), на верхушке заостренные, с округлым или ширококлиновидным основанием, расставленно-зубчатые или почти цельнокрайние (на стерильных побегах с крупными зубцами), сверху зеленые, голые, снизу сизоватые, густоопушенные. Цветки 2,5-3,5 см в диаметре, белые, со слабым ароматом, в 5-7-цветковых облиственных кистях; цветоножки опушенные; чашелистики яйцевидные, остроконечные, опушенные; лепестки обратнояйцевидные; столбики рассечены на 1/3. Плод - многосемянная коробочка около 8x5 мм. Семена около 3 мм длиной. Вес 1000 семян 0,1 г.

Естественное распространение. Северная Америка от Теннесси до Алабамы и Арканзаса. Растет по скалистым берегам рек.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и довольно часто в садах и парках. В СССР - в культуре очень часто в Европейской части, в Западной Сибири и Средней Азии. Посев семян весной, лучше в тепличных условиях. Норма высева 0,5 г на 1 погонный метр.

В Ботаническом саду выращен из семян, полученных из Воронежа, и в 20 лет имеет около 3 м высотой. Вполне зимостоек.

Весьма декоративный кустарник, заслуживает широкого использования в зеленом строительстве на всей территории. БССР и ряда областей союзных республик. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной Америки. - 297с.)