

Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому применению. В официальной медицине используют листья, траву, цветки: *Convallariae folia*, *Convallariae herba*, *Convallariae flores*. (ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459)

Свойства, проявленные в культуре

Корневищный многолетник с широкоэллиптическими листьями. Цветки колокольчатые, с нежным и сильным ароматом, собраны в кисть. Плод - красная ягода. Семена крупные, сплюснутые, с темным рубчиком. Цветет во второй половине мая, две - три недели. Известны сорта: Вариегата с бело-полосатыми листьями; Грандифлора, Беролинезис, Л. Кейзке, Л. закавказский с крупными цветками; Розеа с розовыми цветками; Латифолия с махровыми цветками.

Размножается корневищами, лучше всего в конце августа, можно и ранней весной. Семенное размножение затруднено в связи с плохой всхожестью семян и медленным развитием сеянцев: они зацветают только на четвертый - пятый год. Предпочитает полутень. При сильном затенении слабо цветет. Успешно выращивается на плодородных свежих почвах со значительной добавкой перегноя, листовой земли и торфокрошки. Высаживаются на расстоянии 10-20 см. Эффектен в садах и парках среди деревьев и кустарников, пригоден на срезку и выгонку. (Справочник цветовода: цветочно-декоративные растения открытого грунта / И.Е. Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207с.)

\*\*\*

Растение корневищное. Высотой 25 см. Листья обратнойцевидные (2-3). Цветки белые, душистые, по 6 - 10 в кисти. Околоцветник колокольчатый, шестизубчатый. Цветет с 8-13.V. Продолжительность цветения до 20 дней. Зимостоек. Используется для выгонки, групповых и бордюрных посадок (БООП, растения, 1948). (Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н.В. Смольского. - Минск: Наука и техника, 1972. - 312с.)