

Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому применению. В официальной медицине используют корневища и корни:
Eleutherococci rhizomata et radices. (ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459)

Свойства, проявленные в культуре

Кустарники до 2, редко до 4 - 5 м высотой, со светло-серой продольнобороздчатой корой; ветви и стволы прямые, густо усажены тонкими, хрупкими, загнутыми вниз шипами, иногда без шипов. Почка овальные, красновато- или коричнево-бурые, с несколькими яйцевидными чешуями. Листья пальчатосложные из 5 листочков; листочки обратноовальные или эллиптические, с клиновидным основанием, короткозаостренные, сверху темно-зеленые, голые или с короткими рыжеватыми шетинистыми волосками по жилкам, снизу светлее; края остро-двоякозубчатые; верхние листочки крупнее нижних и на более длинных черешочках; черешки листьев 6 - 12 см длиной, с тонкими разбросанными шипами и сверху с немногими рыжими волосками. Цветки полигамные, двудомные; лепестки пестичных цветков в числе 5, желтоватые, у обоеполых и тычиночных - бледно-фиолетовые; тычинок 5; столбики, сросшиеся до вершины, с 5 свободными рыльцами. Соцветия в виде шаровидных зонтиков на концах ветвей, одиночные, парные или по 3 - 4, на длинных ножках. Плоды ягодообразные, черные, 0,8 - 1 см в диаметре, почти шаровидные, до 50 в головчатых соплодиях, на плодоножках до 2 см длиной, с 5 сплюснутыми с боков косточками, со смолистым запахом. Семена 0,7 мм длиной, 0,4 мм шириной, с валиком по спинной стороне. Вес 1000 плодов до 370 г.

К почве нетребователен, довольно теневынослив.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в парке "Высокое". Размножение семенами посевом после сбора или весной после длительной стратификации, а также корневыми черенками.

В Ботаническом саду имеются саженцы, полученные из Ботанического сада АН УССР (Киев). Саженцы имели среднюю высоту: 2 - летние 14 см, 4 - летние 22 см, 5 - летние 60 см и в 7 лет достигают 140 см. Облиствение в первой половине мая; цветет после облиствения - в июле; плоды созревают в сентябре - октябре. Цветет и плодоносит. Вполне зимостоек.

Кустарник, декоративный листвой и в плодах. Заслуживает более широкого разведения во всех районах БССР и в смежных областях союзных республик. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск, Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. - 351с.)