

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

Свойства, проявленные в культуре

Дерево до 10 - 15 м высотой, или крупный кустарник с голыми ветвями. Кора мелкочешуйчатая, с неприятным запахом. Почki яйцевидные, 6 мм длиной и 2 мм шириной. Листья широкоэллиптические до обратнояйцевидных, внезапно остроконечные, ширококлинообразные до округлых у основания, мелкозубчатые, голые с обеих сторон, темно-зеленые сверху и отчасти блестящие, значительно бледнее снизу; черешок 1 - 2 см длиной, железистый. Цветки 8 - 10 мм в диаметре, белые, собранные в плотные голые кисти, 7 - 15 см длиной. Плоды округлые, около 8 мм в поперечнике, сначала красные, зрелые - темно-красные или темно-пурпурные, кисловато-вяжущего, вкуса. Косточка яйцевидная, коричнево-серая, 5 - 6 мм длиной и 4 - 5 мм шириной. В 1 кг около 18 тысяч семян. Вес 1000 семян 42 - 68 г.

Естественное распространение. Северная Америка от Новой Шотландии до Техаса. Произрастает преимущественно вдоль рек на богатых, влажных почвах, вдоль дорог. Лучше развивается на освещенных местах.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, редко культивируется в других садах и парках. В Европейской части СССР в культуре известна широко. Имеется в Ленинграде, Москве.

В Ботаническом саду выращена из семян, полученных из разных мест. Всходы появились через год. Вполне зимостойка. Листья появляются в первой половине мая. полное облиствение в конце мая, пожелтение листьев в первой половине сентября, опадение в первой половине ноября; цветет в мае - июне; плоды созревают в августе - сентябре. В пору цветения и плодоношения вступила в 7 лет.

Древесина твердая, красновато-бурая, хорошо полируется и идет на изготовление мебели. Представляет интерес как декоративное растение. Можно разводить в БССР и в ряде областей союзных республик.

(Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной Америки. - 297с.)

Кустарник, реже деревцо до 10 м высоты. Декоративна, особенно в период плодоношения, красивой окраской плодов. Цветет несколько позднее черемухи обыкновенной. Неприхотлива к почве и влаге. Плоды съедобны. Применяется в рядовых, групповых и одиночных посадках (Георгиевский С.Д. Древесно-кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - С.24-43).