

### Свойства, проявленные в культуре

Дерево до 8 м высотой, с симметричной густой кроной и серой корой; молодые побеги зеленоватые или красноватые, гладкие, с сизым налетом. Почки яйцевидные, красноватые, на верхушке клювовидно-стянутые, с двумя наружными чешуями и венчиком желтоватых волосков у основания. Листья округлые, до 11 см в диаметре, 9 - 11 - пальчатолопастные, молодые опушенные с обеих сторон, позже волосистые снизу по жилкам и у основания пластинки, сердцевидные; лопасти широколанцетные, ромбические или треугольные, остроконечные, по краю пильчатые или двоякопильчатые; черешки волосистые и примерно в полтора раза короче пластинки или почти равны ей.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В культуре известен в Ленинграде, Киеве, Львове и редко в других местах.

В Ботаническом саду саженцы, полученные однолетними сеянцами из Ботанического сада АН УССР (Киев). Морозами не повреждался. Облиствение в первой половине мая, опадение листьев в сентябре - октябре. Не цвет.

Представляет интерес, как декоративное дерево. Можно разводить на всей территории республики. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск, Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. - 351с.)