

В Беларуси: заносный вид.

Выращивается, иногда дичает. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить существенный вред, в том числе биоразнообразию. (Дубовик Д.В. и др. Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. - Минск: Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. - 192с.)

Свойства, проявленные в культуре

Прямостоящий кустарник до 1-2 (3) м высотой. Кора буровато-серая, с многочисленными чечевичками; молодые побеги голые или тонкоопушенные. Почки около 1 см длиной, заострен-нояцевидные, с зеленовато-бурыми чешуями. Листья непар-ноперистые, длинноэллиптические, 12-25 см длиной и 6-13 см шириной, с 9-23 листочками; листочки ланцетные, реже яйцевидно-ланцетные, длиннозаостренные, с округлым или ширококлиновидным, несколько неравнобоким основанием, 2,5-5 (10) см длиной, 0,8-2,5(3) см шириной, по краю двоякопильчатые, голые или снизу с желтоватыми волосками; прилистники ланцетные, заостренные, зубчатые или цельнокрайние. Цветки белые, 7-8 (11) мм в диаметре, с 5 почти округлыми лепестками и 5 большей частью опушенными чашелистиками; тычинок 20-50, они вдвое длиннее лепестков; цветки в конечных пирамидальных соцветиях (метелках) 10-30 см длиной и 5-12 см шириной; оси соцветия и цветоножки тонко опушены. Листовки 5 мм длиной, с очень коротким отогнутым наружу носиком. Семена немногочисленные, мелкие.

Естественное распространение. Западная и Восточная Сибирь до берегов Тихого океана, Япония, Китай, Монгольская Народная Республика, Корея. Растет по берегам рек и ручьев, образуя заросли, в хвойных и смешанных лесах образует подлесок. Лучше растет на хорошо дренированных почвах; выносит временное затопление. Легко размножается зеленым черенкованием, делением кустов и отсадкой корневой поросли, а также семенами.

В культуре. В БССР - в садах и парках по всей республике, в Центральном ботаническом саду Академии наук. В СССР - в культуре очень широко; в Европейской части от Мурманска до южных границ.

В Центральном ботаническом саду АН БССР в 20 лет имеет 152 см высотой. Вполне зимостоек. Почки раскрываются в первой половине апреля, облиствение в апреле - начале мая, изменение окраски листьев в августе - сентябре, листопад в сентябре; цветет с первой половины июня по сентябрь, семена созревают в августе. Цветет и плодоносит.

Декоративные кустарники для обсадки опушек, подлеска, групповых посадок, для бордюров и живых изгородей, для закрепления откосов во всех интродукционных районах республики и областях союзных республик. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. - 335с.)

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. (Георгиевский С.Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31с.)