

Spiraea cantoniensis x *S. trilobata*

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник с дугообразно изогнутыми кругловатыми светло-коричневыми или красновато-бурыми побегами. В 25 лет достигает высоты 2,0 м и диаметр кроны до 1,5 м. Листья яйцевидные или ромбические, у основания цельнокрайние, на верхушке с 3 и более зубцами. Сверху темно-зеленые, голые, снизу с сизоватым налетом и тремя парами жилок. Цветки чисто белые до 1 см в диаметре, собранные в плоские многоцветковые зонтики на концах олиствленных веточек.

Распускание почек в местных условиях в третьей декаде апреля. Рост побегов с начала мая до половины июля, стерильных - до середины сентября. Цветет в последней декаде мая - начале июня. Продолжительность цветения до 20 дней. Семена почти не завязывает или завязывает очень слабо. Размножается зелеными и одревесневшими (зимними) черенками.

Весьма декоративный, обильно цветущий кустарник весеннего периода цветения. Обилие цветков придает растениям особенно эффектный вид. Прекрасна она и осенью, когда листья приобретают красновато-пурпурную расцветку, причем на побегах сохраняются они до глубокой осени. Дымо- и газоустойчива. Зимостойка. Засухоустойчива.

Пригодна для посадки на самых видных местах в качестве солитеров (одиночных посадок), создания однопорядных и сложных групп, куртин и опушек, живых нестриженных изгородей. (Чаховский А.А., Орленок Е.И. Таволги в декоративном садоводстве. - Минск: Наука и техника, 1985. - 72с.)

Хозяйственно-полезные качества. Использование и переработка

Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. (Георгиевский С.Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31с.)