

В Беларуси: выращивается, иногда дичает. (Третьяков, 1998)

Свойства, проявленные в культуре

Кустарник до 5 м высотой, побеги в молодости слабоволосистые, затем голые. Листья тройчатые, листочки эллиптические или яйцевидные, до 11 см длиной и 6 см шириной, заостренные, остро-и неравнопильчатые, снизу в молодости слегка волосистые, позже голые; боковые листочки сидячие, конечные на черешках до 4 см длиной.

Естественное распространение. Северная Америка от Квебека до Онтарио и Миннесоты, на юг до Южной Каролины, Миссури и Канзаса. Растет во влажных лесах.

В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В СССР культивируется в Курской области, на Украине, в Ташкенте (Русанов), Эстонии (Таллин, Тарту), недостаточно зимостойка. В Ленинграде требует укрытия на зиму.

В Ботаническом саду АН выращена из семян, полученных из Польши (Курник), в 3-летнем возрасте достигла 10 см высотой. В условиях сада отмечено подмерзание побегов. Листовые почки раскрываются в марте - апреле; опадение листьев в октябре.

Декоративный кустарник для одиночных и групповых посадок. Медонос. Заслуживает дальнейшего испытания в южных районах республики. (Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н.Д. - Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. - Вып. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной Америки. - 297с.)