В Беларуси: заносный вид. (Третьяков, 1998)

Выращивается, иногда дичает. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому применению. В официальной медицине используют цветки: Inulae helenii flores. (ГФ РБ. В 3 т. 2009. Т.3. С.699-715)

Свойства, проявленные в культуре

Многолетник. Год интродукции авторами: 1957. Размножение семенное и вегетативное. Посев весной и под зиму. Зацветает на 2-й год. Цветет VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Высота 110-140 см. Дает самосев. Декоративное, лекарственное, пищевое (пряное), красильное, инсектицидное. (Кухарева Л.В., Пашина Г.В. Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986. - С.53)

Инвазионные свойства, проявленные в России

Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада РАН и Ботанического сада МГУ

В Московской губернии вид отмечали, начиная с первых флористических работ, а первый гербарный сбор датирован 1814 г. Используется в народной медицине. В настоящее время изредка встречается по сорным местам у жилья, канавам, придорожным луговинам. I. helenium можно наблюдать у заборов в дачных поселках, куда его могли высаживать дачники. В ряде случаев популяции устойчивы и существуют десятилетиями (Игнатов и др., 1990).

2 категория статуса (Инвазионные виды; +++). В ГБС РАН выращен из семян, собранных в Наурузумском заповеднике, натурализовался и дает самосев (Интродукция растений..., 1979). Дичает и в Ботаническом саду МГУ. Цветение в июне - июле. (Майоров С.Р., Виноградова Ю.К., Бочкин В.Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160с.)