Ареал USSR olim: Арктика: Европейская Арктика (заносное); Европейская часть, Кавказ: все районы; Западная Сибирь: Верхне-Тобольский, Иртышский, Алтайский; Восточная Сибирь: Ангаро-Саянский; Дальний Восток (заносное): Камчатский, Приморский, Сахалинский; Средняя Азия: Сыр-Дарьинский, Тянь-Шанский. На опушках, в разреженных лесах, на лесосеках, в кустарниках, на полях, в огородах, садах, сорное, в нижне- и среднегорном поясе; единично или группами, иногда зарослями. (Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349с.)

В Беларуси: вид природной флоры. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

Входит в Специализированный кадастр растений, животных и грибов Республики Беларусь, в котором собраны некоторые данные о химическом составе для использования в народном хозяйстве Беларуси. Смотреть...

Полезные свойства

Лекарственное
Отвар - слабительное [431, 559]. Обладает антибактериальной активностью [2706].

Надземная часть Аналгезирующее, ранозаживляющее; наружно (припарки) - при опухолях; измельченная - при трещинах сосков у кормящих матерей [431, 574, 2222]. В ветеринарии отвар (местно) - при трещинах сосков у коров [574, 1361].

Листья Сок (свежий) - мягчительное [1361], при сахарном диабете [796]; распаренные (местно) - при мастите [716, 1361]; молодые - в пищу как салат [481, 559, 1361].

Цветки, плоды Проявляют антибактериальную активность [574].
[Источники] (Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349с.)