

Синонимы: *Hieracium pilosella* L. (Определитель высших растений Беларуси, 1999)

Ареал USSR olim: Европейская часть: все районы, кроме Заволжского, Нижне-Донского и Нижне-Волжского; Кавказ: все районы; Западная Сибирь: Обская, Верхне-Тобольская. На окраинах светлых боров, песчаной или каменистой почве, субальпийских, альпийских лугах, окраинах морен, у дорог, канав, на насыпях, вырубках, паровых полях, сорное, ухудшает пастбища. (Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349с.)

В Беларуси: вид природной флоры. (Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.)

Входит в Специализированный кадастр растений, животных и грибов Республики Беларусь, в котором собраны некоторые данные о химическом составе для использования в народном хозяйстве Беларуси. [Смотреть...](http://bchemcad.basnet.by/plants.php)

Полезные свойства

Лекарственное

Во Франции при клинических испытаниях водный и спиртовой экстракты показали возможность лечения рецидивных форм бруцеллеза, устойчивых к обычным антибиотикам [2232, 2320]. В народной медицине - противовоспалительное, вяжущее, желчегонное, гемостатическое при внутренних кровотечениях, детоксикационное и ранозаживляющее [1327], сокогонное при пониженной кислотности желудочного сока [1181], при заболеваниях печени, язвенной болезни желудка, дизентерии, туберкулезе легких, анемии, асците [1327], уремии [713], мочекаменной болезни, малярии, анорексии [1768], бешенстве [473], гемералопии [1274]. Отвар (наружно) - при скрофулезе, конъюнктивите, гингивите [473], полоскание - при ангине, кандидозном стоматите у детей; для промывания гнойных ран и спринцеваний при белях [1327]. Порошок - при желтухе; наружно - ранозаживляющее [1181]. Сок, млечный сок - при конъюнктивите и для обострения зрения [2274]. В эксперименте оказывает сильное диуретическое действие, способствует выделению хлористых и азотистых соединений, не раздражает почечного эпителия. Рекомендовано для лечения нефрита, олигурии, протеинурии, мочекаменной болезни, асцита, инфильтратов, одышки, гипертрофии миокарда, подагры, пневмонии, гриппа и его осложнений [2274]. Экстракт проявляет антибактериальную активность в отношении возбудителей бруцеллеза [1596].

Подземная часть Вяжущее, гемостатическое [932], усиливает саливацию [2274]. В ветеринарии - антигельминтное [1361].

Надземная часть Свежая - детоксикационное при укусах змей [1327]. В Республике Коми (отвар, настой) - при желудочно-кишечных заболеваниях и женских болезнях, нарушениях обмена веществ; порошок - ранозаживляющее [476]; в Беларуси - при малярии [1060]; в составе сбора - при асците [949]. Мазь (на свином жире) - при панарициях [1327].

Листья (свежие, измельченные). Местно - при гнойных ранах, нарывах, панарициях [1327].

Соцветия При заболеваниях печени и органов желудочно-кишечного тракта [1153]; отвар - при желтухе [943]; настой - тонизирующее [2274].

Кормовое (цветки, плоды) для боровой птицы [782].

Ядовито для овец [1897].

[Источники] (Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349с.)